

Voetgangersongevallen

Aard, oorzaken, gevolgen en risicofactoren



694

slachtoffers vulden een vragenlijst in over hun voetgangersongeval waarvoor SEH-behandeling nodig was



11%

kwam in botsing met een rijdende verkeersdeelnemer

89%

had een enkelvoudig voetgangersongeval. Hiervan botste **44** procent met een object en **45** procent viel of gleed uit

Voetgangersongeval in het verkeer¹

54%

gebeurde op de openbare weg

70%

gaf aan dat het gedrag van de ander bijdroeg aan het ongeval

40%

nam maatregelen om een ongeval te voorkomen in de toekomst

Enkelvoudig voetgangersongeval¹

58%

gebeurde op de stoep

62%

gaf aan dat het eigen gedrag bijdroeg aan het ongeval

47%

nam maatregelen om een ongeval te voorkomen in de toekomst

Omstandigheden van het ongeval²



70% van de ongevallen gebeurde bij daglicht



25% van de slachtoffers was afgeleid, bijvoorbeeld doordat zij praatten met iemand



13% van de slachtoffers had 6 uur voor het ongeval alcohol gedronken

Risicofactoren op een ongeval

Verhoogd risico op een **enkelvoudig voetgangersongeval** voor voetgangers die



handsfree bellen



een loophulpmiddel gebruiken



medicatie gebruiken



72%

had verdere behandeling na het SEH-bezoek nodig, zoals poliklinisch of fysiotherapie



59%

had na twee maanden nog steeds last van de verwondingen

Bron: Ongevallen met voetgangers. Omvang, aard, oorzaken, gevolgen en risicofactoren: 2024, VeiligheidNL.

¹In dit onderzoek is een steekproef van voetgangers die na een ongeval te voet op een SEH-afdeling zijn behandeld, in de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023, benaderd voor een vragenlijstonderzoek. In totaal vulden 694 slachtoffers een vragenlijst in binnen twee maanden na hun SEH-bezoek. Er waren (aanvullend) 154 slachtoffers die op wietjes een voetgangersongeval kregen. Deze groep is niet meegenomen in dit overzicht.

² Percentages gaan over alle 694 voetgangersslachtoffers (voetgangersongevallen in het verkeer **en** enkelvoudige voetgangersongevallen).