

SEH patiënten (70+) na een val of val-gerelateerd letsel

Valanamnese

Valgeschiedenis, tijdstip en plaats. Is er een verband tussen de val en snel overeind komen (orthostatische hypotensie), struikelen of uitglijden (loop-, balans- of visusstoornis of obstakel in de omgeving), hoesten of urineren (reflexhypotensie), een maaltijd (postprandiale hypotensie), omhoog of opzij kijken (arteriële compressie of compressie van de sinus carotis), of verlies van bewustzijn (syncope of insult)?

Andere symptomen bij val: duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd, palpitaties, incontinentie, trekkingen of tongbeet, asymmetrisch krachtverlies (CVA) of pijn op de borst.

Lichamelijk onderzoek

Let op verwardheid, cognitieve stoornissen, orthostatische hypotensie, nystagmus, souffles (carotiden), ritmestoornissen, visusstoornissen, focale neurologische symptomen, sensibiliteits- en loopstoornissen, risicogedrag, gewicht, afwijkingen van het bewegingsapparaat en omgevingssituatie.

Medicatie

Middelen geassocieerd met vallen

- Benzodiazepinen
- Antihypertensiva
- Antipsychotica
- Langwerkende opiaten
- Vaatverwijders

SEH patiënten (70+) na een val of val-gerelateerd letsel

