

# Alcohol en ongevallen

## Vervolgonderzoek na SEH-bezoek



**11%**  
van de slachtoffers had alcohol gedronken vóór het ongeval<sup>1</sup>



**3x**  
meer dan dat op de SEH werd geregistreerd<sup>2</sup>

## Kenmerken van slachtoffers



**61%**  
was man



**29%**  
was 18-24 jaar



**74%**  
dronk >2 glazen



**57%**  
dronk laatste glas <1 uur<sup>3</sup>

## Kenmerken van ongeval



was op vrijdag, zaterdag of zondag



was in avond of nacht

## Slachtoffers van een alcoholgerelateerd ongeval<sup>4</sup>

noemden vaker het **eigen gedrag** als oorzaak van het ongeval

hadden een **hoger regulier alcoholgebruik** dan de Nederlandse bevolking

waren vaker betrokken bij een ongeval met **geweld**



zeiden vaker **niet helder te denken** op het moment van het ongeval

hadden vaker licht of ernstig **hersensletsel**

**Bron:** Alcohol en ongevallen: LIS-ervolgonderzoek. VeiligheidNL (2024).

<sup>1</sup> In totaal vulden 2.573 slachtoffers van 16 jaar en ouder een vragenlijst in binnen 4 maanden na hun SEH-bezoek. Hiervan gaven 290 slachtoffers aan alcohol te hebben gedronken vóór het ongeval.

<sup>2</sup> Er waren 3,15 keer meer ongevallen waarbij alcohol betrokken was dan uit de registratie/triage op SEH-afdelingen van ziekenhuizen van het Letsel Informatie Systeem bleek.

<sup>3</sup> Van de slachtoffers dronk 57 procent het laatste glas binnen 1 uur vóór het ongeval.

<sup>4</sup> In vergelijking met slachtoffers die geen SEH-bezoek wegens een alcoholgerelateerd ongeval hadden.